



Urdu

اپریشن کے ذریعے بچے کی پیدائش (Having a baby by CSection aesarian)

داخلے سے پہلے جائزہ (Preadmission assessment)

اگر آپ کے بچے کی پیدائش طے شدہ اپریشن کے ذریعے ہو رہی ہے تو نامزدہ کلینک میں آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ بنائی جائے گی جہاں بے ہوشی کے ماہر ڈاکٹر آپ کو دیکھیں گے اور آپ کے ہسپتال میں داخلے کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ آپ کو اپریشن اور ہسپتال میں قیام کے دوران اپنی دیکھ بھال سے متعلق سوالات پوچھنے کا موقع دیا جائے گا۔

آپ کو ہدایات دی جائیں گی کہ اپریشن کی تیاری میں کھانا پینا کب بند کیا جائے۔ ایسا اپریشن والے دن ہسپتال آنے سے پہلے ہو گا۔

پیٹ میں آپ کا بچہ ”معمول کے مطابق“ حرکت جاری رکھے گا

اگر بچے کی حرکت میں کمی آتی ہے تو براہ مہربانی برتہ یونٹ سے رابطہ کیجیے

داخلے کے وقت (On admission)

آپ کو اپریشن والے دن ہسپتال میں داخل کیا جائے گا

آپ کو.....جانا ہوگا

.....تاریخ

.....وقت

.....کھانا بند

معمول کی سرگرمیاں (Normal activities)

معمول کی سرگرمیاں بحال کرنے میں کچھ وقت لگے گا کچھ تجاویز یوں ہیں:

• چھ ہفتے تک بچے کے علاوہ کوئی بھاری وزن نہیں اٹھانا، جب بھی اپنے آپ کو ہلکے کام کاج کے قابل سمجھیں، شروع کر دیں۔

• گاڑی اس وقت تک نہ چلائیں جب تک اچانک حرکت پر درد سے نجات نہ مل جائے۔

• کچھ عورتوں کو تین، چار ہفتے کے بعد نئے زخم کا درد محسوس ہو سکتا ہے چونکہ جو نسیں کاٹی گئی تھیں ان کے زخم مندمل ہو رہے ہیں۔ یہ درد لگ بھگ ایک ہفتہ جاری رہے گا۔ اگر کوئی نشوونما ہو تو اپنے مقامی ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے۔

دیکھ بھال کرنے والے، بلا معاوضہ مدد اور دیکھ بھال مہیا کرتے ہیں۔ یہ یا تو خاندان کے افراد ہو سکتے ہیں یا دوست اور پڑوسی۔ یہ بات اہم ہے کہ آپ صحت کے عملے کو آگاہ کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔

مفت اور قابل اعتماد ترجمانی کی سہولت موجود ہے، سات دن چوبیس گھنٹے

ترجمان کے لیے عملے سے رابطہ کیجیے سماعت سے محروم لوگوں کے لیے بھی ترجمانی کی سہولت موجود ہے۔

(AUSLAN)

نیو ساؤتھ ویلز میں صحت کی تمام سہولیات میں سگریٹ نوشی ممنوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کی اجازت نہ تو احاطے میں اور نہ ہی عمارات کے اندر ہے۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے میں مدد کے لیے کوپٹ لائن کو اس نمبر پر ڈائل کیجیے: 131848

ہسپتال کے قریب اور ہسپتال کے احاطے میں مفت پارکنگ کی سہولت موجود ہے۔

بحالی صحت (Recovery)

اگر آپ کو صحت کا کوئی اور مسئلہ نہ ہو تو آپ کو اپریشن کے چند گھنٹے بعد ہی اٹھ کر چلنے میں مدد کی جائے گی، اس سے آپ کے زخم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ کو کم از کم بارہ گھنٹے کے لیے مٹانے کی صفائی کے لیے کیتھیٹر۔

یا باریک نلکی لگائی جائے گی۔ اس کی وجہ سے آپ کو چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو گی۔ آپ کو تقریباً بارہ گھنٹے کے لیے وریڈی ٹیکوں کے ذریعے علاج کے لیے ٹیوبیں لگی ہوں گی جنہیں عموماً دوسرے دن اتار دیا جاتا ہے۔

خوراک اور آرام (Food and rest)

ہم آپ کو بھوک اور عام غذائی معیار کے مطابق کھانا دیں گے۔ اگر آپ کی کوئی غذائی ترجیحات ہیں تو براہ مہربانی ہمیں مطلع کیجیے۔ ہم اس کے بھی حامی ہیں کہ جب بھی آپ کو پیاس لگے مشروب پیں۔ اس سے گردے کے کام میں آسانی ہوتی ہے۔

اچھی خوراک اور آرام سے سرجری کے بعد بحالی صحت میں مدد ملتی ہے۔ ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ دن کے وقت آرام کے اوقات رکھیں چونکہ ابتدائی ہفتوں میں بچہ رات کے وقت جاگتا رہے گا اور اس کو دودھ پلانے اور پر سکون کرنے کی ضرورت پڑے گی۔

ابتدائی جسمانی سرگرمی اور مشق بحالی صحت کے لیے اچھی ہے، اس سے بعد از اپریشن پیچیدگیوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے اور درد میں کمی آتی ہے۔

بچے کو تھامنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے سے آپ کے بحالی صحت کے عمل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ آپ کو اپنے بچے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

گھر کے لیے واپسی (Going home)

اپریشن کے ذریعے پیدائش کے بعد عموماً دو یا تین راتوں کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ بعض عورتیں دوسروں کے مقابلے میں جلدی صحت یاب ہو جاتی ہیں اور جلدی گھر جانا چاہتی ہیں۔ اگر آپ یہی فیصلہ کریں تو دایوں کی مدد لیں جو آپ کو گھر میں مزید مدد اور تربیت مہیا کریں گی۔

ہسپتال میں داخلے پر آپ کا معائنہ کیا جائے گا، کچھ کاغزی کارروائی کے بعد ہسپتال کا گاون پہن لیں گی۔ اپریشن تھیٹر کی تیاری کے بعد تھیٹر کا عملہ آپ کو بلائے گا۔ سرجری میں جانے سے پہلے آپ کو ایک ترشہ توڑ (انٹیسڈ) دوا پلائی جائے گی (عموما شفاف سیال کی تھوڑی مقدار۔ سوڈیم سائٹریٹ) اس وارڈ میں زیادہ جگہ نہیں ہے لہذا آپ انتظار کے وقت صرف اپنے شریک حیات یا ایک مددگار کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔

بے ہوشی کی دوا (Anaesthetic)

اپریشن تھیٹر میں، اپریشن سے پہلے آپ کے بازو میں درون وریڈی ڈرپ لگائی جائے گی۔ بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر یا تو

- حرام مغز میں نلکی (ایپیجیورل کیتھیٹر) ڈالے گا تاکہ آپ جاگ رہے ہوں، یا

- آپ کو اپریشن کے لیے سلا دے گا (مکمل بے ہوشی)

اگر آپ کو اپیجیورل بے حسی دی گئی ہو تو آپکا ایک مددگار (شوہریا مددگار) اپریشن تھیٹر میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔

پیدائش (The birth)

جونہی آپ تیار ہونگے ڈاکٹر اپریشن شروع کر دے گا۔ اگر آپ جاگ رہے ہوں تو آپ کو دباؤ یا کھچاؤ محسوس ہو سکتا ہے جبکہ وہ بچے کی پیدائش کی تیاری کر رہے ہونگے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کو خشک کر کے آپ کے پاس لایا جائے گا۔

آپ کا بچے کے ساتھ جسمانی لمس ہوگا اور پہلی دودھ پلائی اپریشن تھیٹر کے کمرہ بحالی میں ہوگی یا بعد از پیدائش کے وارڈ میں ہوگی۔ کچھ بچوں کو سانس لینے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی صورت میں بچے کے ساتھ طبعی لمس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔

پلیسٹا نکال کر ڈاکٹر اپریشن مکمل کر لے گا۔ اس عمل میں عمومی طور پر پیدائش کے مقابلے میں زیادہ وقت لگتا ہے پورے اپریشن پر تقریباً پینتالیس منٹ لگیں گے

بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر بچے کی پیدائش کے بعد اگر آپ جاگ رہی ہوں تو شاید معمولی مقدار میں سکون بخش دوائی دے۔ اس سے آپ سکون اور غنودگی محسوس کریں گی مگر سویں گی نہیں۔ پھر آپ اپنے بچے کے ساتھ بعد از پیدائش والی وارڈ میں۔

جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے کمرہ بحالی میں جائیں گی۔ اگر آپ کو بچے سے الگ رکھا گیا ہو تو اس عرصہ میں آپ کا مددگار بچے کے ساتھ رہے گا۔

بچہ

(The baby)

آپ کے بچے کا معائنہ، وزن اور پیمائش یا تو کمرہ پیدائش، کمرہ بحالی یا بعد از پیدائش کے وارڈ میں کیے جائیں گے۔ اسی وقت بچے کو وٹامن ک اور ہیپٹائٹس ب کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔

ابتدا میں بچے کو دودھ پلانے اور اسکی دیکھ بھال کرنے میں آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ بعد از پیدائش وارڈ کی دایاں، بچے کو دودھ پلانے، اس کی دیکھ بھال کرنے یعنی نیبی بدلنے، نہلانے اور اس کو پر سکون کرنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ بچہ آپ کے کمرہ میں رہے گا تاکہ آپ کو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے۔

آپ کا شریک حیات یا مددگار بچے کی عمومی دیکھ بھال میں بھر پور طریقے سے شامل رہے گا۔ دوسرے یا تیسرے روز آپ کافی خود انحصار ہو جائیں گی بچے کی دیکھ بھال کے لیے کم سے کم مدد کی ضرورت ہوگی۔

درد

(The pain)

درد سے نمٹنے کی حکمت عملی بعد از پیدائش کی وارڈ میں آپ کی دیکھ بھال کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کو درد سے آرام پہنچانے کی سہولت کی موجودگی اور اس کے استعمال سے آگاہی ہو۔ اپریشن کے بعد درد کو قابو میں رکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ طریقے کے انتخاب کا انحصار بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر، بے ہوشی کی دوا اور الرجی وغیرہ پہ ہے۔ تھیٹر میں ریڑھ کی ہڈی میں مارفین کا ٹیکہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس (ٹیکے) سے پہلے چوبیس گھنٹے میں درد سے آرام ملے گا۔ ضرورت کے مطابق مزید درد مار دوائی دی جائے گی۔

کچھ عورتوں کو ایک ڈریپ دی جاتی ہے جو ایک مشین کے ذریعے چلائی جاتی ہے جس سے درد کی دوائی کو آپ خود کنٹرول کرتے ہیں (پی سی اے)۔

پہلے دو تین دن تک درد سے آرام میں اضافہ عام طور پر سوزش مخالف درد مار دوائیوں اور پیراسیٹامول کے ذریعے کیا جاتا ہے پین ٹیم آپ کے پاس آئے گی اور درد سے نمٹنے میں آپ کی مدد کرے گی۔

بے ہوش کرنے اور اپریشن کے بعد درد کم کرنے لیے استعمال میں لائی جانے والی دوائیوں کو بریسٹ فیڈنگ میں تحفظ کے حوالے سے پرکھا جا چکا ہے۔

مزید معلومات کے لیے مدرسیف (محفوظ ماں) سے رابطہ کیجیے: 9382 6539

مشاہدہ

(Observations)

پہلے چوبیس گھنٹوں کے دوران، آپ کا باقائیدگی سے معائنہ کرکے نتائج درج کیے جائیں گے۔ آپ کو چوبیس گھنٹے تک آکسیجن ماسک یا ناک میں دو شاخہ نلکی کے ذریعے آکسیجن دی جائے گی۔

زخم

(The wound)

آپ کے زخم پر پٹی پہلے ایک دو دن تک رہنے دی جائے گی۔ پٹیاں عام طور پر تیسرے دن اتاری جاتی ہیں اور اس کے بعد اکثر زخم کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں انہیں صاف اور خشک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہانے کے دوران زخم گیلیے ہو جانے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، نہانے کے بعد اسے خشک کر لیں۔ کچھ عورتوں کو اپنے پیٹوں کو اوپر اٹھا کر زخم کو ہوا لگانی ہوگی تاکہ زخم خشک رہے۔

کبھی کبھار انفکشن سے محفوظ رہنے کے لیے ایوڈین کا محلول لگایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات زخم سے مواد نکالنے کی نلکی زخم کے اندر رکھ دی جاتی ہے تاکہ خون کی نکاسی ہو اور زخم جلد بھر جائے۔ یہ عام طور پر چوبیس سے اڑتالیس گھنٹے کے بعد نکال دی جاتی ہے۔